

Exercice 1. 1. Dans \mathbb{R}^3 , on considère $F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z \right\}$ et $G = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid (y, z) \in \mathbb{R}^2 \right\}$.

F et G sont-ils des sous-espaces supplémentaires dans \mathbb{R}^3 ?

2. Dans \mathbb{R}^3 , trouver un supplémentaire de $\text{vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$. Est-ce le seul ?

Exercice 2. Déterminer les \mathbb{R} -espaces vectoriels parmi les exemples suivants :

- | | |
|---|---|
| 1. {polynômes de degré n } | 7. $\{0\} \cup \{z \in \mathbb{C} \mid \arg(z) = \theta\}$ |
| 2. {polynômes de degré $\leq n$ } | 8. $\{z \in \mathbb{C} \mid \text{Re}(z) \geq 0\}$ |
| 3. {applications de $[0, 1]$ vers \mathbb{R} } | 9. $\mathbb{R} \cup i\mathbb{R}$ |
| 4. {applications de $[0, 1]$ vers \mathbb{Q} } | 10. $\left\{ \text{suites } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_{n+1} - 3u_n \right\}$ |
| 5. $\left\{ f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(1) = 0 \right\}$ | 11. $\left\{ \text{suites } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4(u_{n+1})^2 - 3u_n \right\}$ |
| 6. $\left\{ f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = 1 \right\}$ | |

Exercice 3. Soient $F_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0 \right\}$, $F_2 = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ et $F_3 = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.

Montrer que : $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2 = F_1 \oplus F_3$

Exercice 4. Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soit P l'ensemble des fonctions paires, et I celui des fonctions impaires. Montrer que I et P sont des sous-espaces vectoriels de E supplémentaires.

Exercice 5. Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel et A et B deux parties de E . Comparer :

- $\text{vect}(A \cup B)$ et $\text{vect}(A) \cup \text{vect}(B)$
- $\text{vect}(A \cap B)$ et $\text{vect}(A) \cap \text{vect}(B)$
- $\text{vect}(\text{vect}(A))$ et $\text{vect}(A)$

Exercice 6. Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E .

- Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace de E sssi $F \subset G$ ou $G \subset F$
- En déduire que la réunion de deux sous-espaces vectoriels strictement inclus dans E est strictement incluse dans E .
- Comparer $F + G$ et $\text{vect}(F \cup G)$

Exercice 7. L'ensemble $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 5x - y + 3z = 0 \right\}$ est-il un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^3 ?

Même question avec $3x - 2y = 0$? , $(3x - 2y)(5x - y + 2z) = 0$? , $(3x - 2y)^2 + (5x - y + 2z)^2 = 0$?

Exercice 8. Dans \mathbb{R}^3 , on considère les vecteurs : $V_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $V_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$ et $V_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ b \end{pmatrix}$

où a et b sont deux réels. Déterminer les réels a et b pour que $\text{vect}(V_1, V_2) = \text{vect}(V_3, V_4)$

Exercice 9. Dans \mathbb{R}^3 , on considère les vecteurs : $V_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $V_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$. Soient

$V = \text{vect}(V_1)$ et $W = \text{vect}(V_2, V_3)$.

Déterminer : $V \cup W$, $V \cap W$, $V + W$. A-t-on $V + W = V + \bigoplus W$? V et W sont-ils supplémentaires ?

Exercice 10. Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel. Soit (v_1, v_2, v_3) une famille libre de vecteurs de E .

1. Montrer que $v_1 + v_2, v_1 + v_3$ et $v_2 + v_3$ sont linéairement indépendants.
2. En est-il de même pour $v_1 + v_2 + v_3, v_1 - v_2 + v_3$ et $v_1 + v_2 - v_3$?

Exercice 11. Soit (e_1, e_2, e_3) une base de l'e.v. E .

1. Montrer que $(e_1, e_2 + 2e_3, 2e_2 + e_3)$ est une base de E .
2. Déterminer l'ensemble des vecteurs de E ayant les mêmes coordonnées dans les deux bases.

Exercice 12. Dans \mathbb{R}^4 , soit les vecteurs : $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Soient $F = \text{vect}(u, v, w)$ et $G = \text{vect}(x, y)$.

Quelles sont les dimensions de F , G , $F + G$ et $F \cap G$?

Exercice 13. Déterminer les rangs des familles (a, b, c, d) de \mathbb{R}^4 suivantes, et, éventuellement, donner les relations linéaires entre ces vecteurs :

$$1. a = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ et } d = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$2. a = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } d = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$3. a = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix} \text{ et } d = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 14. Soient $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $w = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Compléter cette famille en une base de \mathbb{R}^4

Exercice 15. Dans les cas suivants, déterminer si F et G sont des sous-espaces supplémentaires :

$$1. E = \mathbb{R}^4, F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z \text{ et } y + z + t = 0 \right\} \text{ et } G = \text{vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$2. E = \mathbb{R}^3, F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x + z = 0 \text{ et } x - 2y + z = 0 \right\} \text{ et } G = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0 \right\}$$

Exercice 16. Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soient $f_1 : x \rightarrow 1$, $f_2 : x \rightarrow x$, $f_3 : x \rightarrow x^2$ et $f_3 : x \rightarrow e^x$. Montrer que ces quatre vecteurs de E forment une famille libre

Exercice 17. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = \mathbb{R}_{n-1}[X]$. Soit $(a_k)_{1 \leq k \leq n}$ un système de n réels deux à deux distincts.

Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note P_k le polynôme :
$$P_k = \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq k}} \left(\frac{X - a_j}{a_k - a_j} \right).$$

1. Pour $(i, k) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, calculer $P_k(a_i)$
2. Montrer que $(P_k)_{1 \leq k \leq n}$ est une base de E .
3. Soit $Q \in E$. Déterminer les composantes de Q dans la base $(P_k)_{1 \leq k \leq n}$

Exercice 18. Soit (x, y, z) une famille libre du \mathbb{K} -espace vectoriel E . Soient $u = x + y$, $v = y + z$ et $w = x + z$. Montrer que (u, v, w) est une famille libre.

Exercice 19. Trouver une base de \mathbb{R}^4 contenant $u = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 20. Dans \mathbb{R}^4 , soit les vecteurs : $u = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 6 \\ -6 \end{pmatrix}$, $z = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$ et $t = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Soient $F = \text{vect}(u, v, w)$ et $G = \text{vect}(z, t)$.

Quelles sont les dimensions de F , G , $F + G$ et $F \cap G$?

Exercice 21. Soit $E = \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Soient (f_1, f_2, f_3) définies par :

$\forall x \in \mathbb{R} : f_1(x) = \sin(x + 1)$, $f_2(x) = \sin(x + 2)$, $f_3(x) = \sin(x + 3)$.

Montrer que (f_1, f_2, f_3) est une famille liée.

Exercice 22. Montrer que $F = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^3 \mid x + y = z \text{ et } x + iy - z = 0 \right\}$ est un sous-espace vectoriel du \mathbb{C} -espace vectoriel \mathbb{C}^3 . En déterminer une base.

Exercice 23. Déterminer le rang du système de vecteurs de \mathbb{R}^3 et éventuellement les relations entre les vecteurs :

$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $c = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Exercice 24. Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on considère la fonction $f_a : x \rightarrow \exp(ax)$. Montrer que la famille $(f_a)_{a \in \mathbb{R}}$ est une famille libre

Exercice 25. Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on considère la fonction $f_a : x \rightarrow \cos(ax)$. Montrer que la famille $(f_a)_{a \in \mathbb{R}}$ est une famille libre

Exercice 26. Dans $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, on considère la fonction $f_a : x \rightarrow |x - a|$. Montrer que la famille $(f_a)_{a \in \mathbb{R}}$ est une famille libre

Exercice 27. Soit $E = \mathbb{R}[X]$ et $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, \deg(P_n) < \deg(P_{n+1})$.

1. Montrer que $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille libre de E
2. Montrer que $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de E si et seulement si : $\forall n \in \mathbb{N}, \deg(P_n) = n$

Exercice 28. Soit F_1, F_2, F_3 trois sev de E . Montrer que $F_1 + F_2 + F_3$ est une somme directe si et seulement si : $F_1 \cap F_2 = \{0_E\}$ et $(F_1 + F_2) \cap F_3 = \{0_E\}$. Généraliser.

Exercice 29. Soit $E = \mathbb{R}_3[X]$, et $F = \{P \in E \mid P(0) = P(1) = P(2) = 0\}$,
 $G = \{P \in E \mid P(1) = P(2) = P(3) = 0\}$ et $H = \{P \in E \mid P(-X) = P(X)\}$.

1. Montrer que : $F \oplus G = \{P \in E \mid P(1) = P(2) = 0\}$
2. Montrer que : $F \oplus G \oplus H = E$